

<b>PATOLOGIE VARIE</b>	Sindrome influenzale o febbre > 38°C	Sospensione di 2 settimane dopo la completa guarigione
	Febbre reumatica	Sospensione per 2 anni dopo la cessazione dei sintomi e in assenza di cardiopatia cronica
	Allergia stagionale	Sospensione nella fase acuta
	Celiachia	Idonei se seguita dieta priva di glutine
	Diabete	Non idonei se in trattamento insulinico
	Neoplasie Maligne	Non idonei
	Malattie autoimmuni	Non idonei se la malattia coinvolge più organi
	Malattie cardiovascolari	Non idonei in caso di malattia coronarica, portatori di stent aorto coronarici, aritmia grave, malattia cerebro vascolare, trombosi arteriosa o venosa ricorrente.
	Ipertensione arteriosa	Idonei se in trattamento farmacologico con buon compenso e senza danno d'organo
	Malattie organiche del SNC	Non idonei
	Trapianto di organo solido, di CSE, di cornea, di sclera, di dura madre o xenotrapianto	Non idonei
	Diatesi emorragiche e coagulopatie congenite o acquisite	Non idonei
	Epilessia	Non idonei. Possono essere accettati soggetti con pregresse convulsioni febbrili infantili
	Anafilassi	Non idonei
	Manifestazioni allergiche gravi (soprattutto a penicillina, cefalosporine, veleno di imenotteri)	Sospensione di 2 mesi dopo l'ultima esposizione
	Affezioni gastrointestinali, epatiche, urogenitali, ematologiche immunologiche, renali, respiratorie, metaboliche	Non idonei se croniche, recidivanti o con permanente danno d'organo. Negli altri casi sospensione temporanea a discrezione del medico
	Infezione da HBV (epatite B), HIV (sieropositività/ AIDS) Treponema Pallidum (sifilide)	Non idonei
	Convivenza abituale o occasionale con soggetto con positività per HBsAg e/o anti-HCV	Sospensione per 4 mesi dopo la cessazione della convivenza, anche se il soggetto è vaccinato per l'epatite B
	Rapporti sessuali con partner positivo ai test per l'epatite B, l'epatite C o AIDS	Sospensione per 4 mesi dopo l'ultimo rapporto
	Comportamenti sessuali a rischio (etero, omo e bisessuali occasionali, con più partner, con tossocodipendenti, con scambio di denaro o droga)	Sospensione per 4 mesi dopo l'ultimo rapporto
	Tubercolosi	Sospensione per 2 anni dopo la completa guarigione
	Malattia di Lyme	Sospensione per 1 anno dopo la guarigione
	Toxoplasmosi	Sospensione per 6 mesi dopo la completa guarigione
	Mononucleosi infettiva e infezione accertata da CMV	Sospensione per 6 mesi dopo la completa guarigione
	Virus del Nilo Occidentale (WNV)	Sospensione di 28 giorni dal rientro dai paesi a rischio. La sospensione NON si applica nel caso in cui venga eseguito il test
	Malattia di Chagas o tripanosomiasi americana	Non idonei in caso di test per anticorpi Tripanosoma Cruzii positivo.
	Malaria	I soggetti che hanno sofferto, di malaria, coloro che hanno vissuto o visitato una zona endemica, possono essere ammessi alla donazione dopo 6 mesi dalla risoluzione del quadro clinico o dal rientro dopo aver effettuato un test
<b>VARI</b>	Tatuaggi, piercing, foratura lobi, agopuntura	Sospensione di 4 mesi dall'esecuzione
	Spruzzo delle mucose con sangue o lesioni da ago	Sospensione di 4 mesi dall'evento accidentale
	Trasfusione di emocomponenti o somministrazione di emoderivati	Sospensione di 4 mesi dopo la trasfusione/somministrazione
<b>INTERVENTI CHIRURGICI O ESAMI ENDOSCOPICI</b>	Intervento chirurgico maggiore	Sospensione di 4 mesi dall'intervento e in condizioni di benessere
	Intervento chirurgico minore	Sospensione di 1 settimana dopo la completa guarigione clinica
	Esame endoscopico con strumenti flessibili	Sospensione di 4 mesi dall'esecuzione

<b>CURE DENTISTICHE</b>	otturazioni, pulizia	Sospensione di 48 ore dopo l'esecuzione
	Estrazioni non complicate, devitalizzazioni, implantologia	Sospensione di 1 settimana dopo la completa guarigione
	Innesto di tessuto osseo autologo o omologo	Sospensione di 4 mesi dopo l'innesto
<b>GRAVIDANZA</b>	In gravidanza	Non idonea
	Post gravidanza	Sospensione di 12 mesi dopo il parto
	Interruzione di gravidanza	Sospensione di 6 mesi dopo interruzione di gravidanza
<b>FARMACI</b>	Antistaminici/terapie desensibilizzanti (allergie)	72 ore dall'ultima somministrazione
	Antibiotici	15 giorni dal termine della terapia
	Cortisonici	16 giorni dal termine della terapia
	Antidolorifici/antinfiammatori	da 1 a 7 giorni a seconda della patologia
	Ansiolitico	Nessuna sospensione
	Antipertensivo	Nessuna sospensione con buon compenso dei valori pressori
	Anti-diabetici orali	Nessuna sospensione con buon compenso dei valori glicemici
	Eutirox	Nessuna sospensione con buon compenso del TSH
	Anticoncezionali e terapie ormonali sostitutive	Nessuna sospensione
<b>VACCINAZIONI</b>	Epatite B	7 giorni se asintomatico
	Epatite A	48 ore se asintomatico
	Virus o batteri vivi attenuati (febbre gialla, tifo, TBC, rosolia, parotite, morbillo)	4 settimane se asintomatico
	Tossoidi (tetano, difterite, pertosse)	48 ore se asintomatico
	Virus, Batteri, rickettise inattivi/uccisi e vaccini ricombinanti (papilloma virus, influenza, poliomelite, varicella)	48 ore se asintomatico
<b>VIAGGI</b>	<b>EUROPA</b>	Nessuna sospensione salvo situazioni epidemiologiche particolari
	<b>REGNO UNITO</b>	Non idonei i soggetti che tra il 1980 e il 1996 <ul style="list-style-type: none"> <li>hanno soggiornato per più di 6 mesi</li> <li>hanno subito interventi chirurgici</li> <li>hanno ricevuto trasfusioni di sangue o emoderivati</li> </ul>
	<b>AMERICA DEL NORD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alaska</li> <li>Canada, USA</li> <li>Messico</li> </ul>	Nessuna sospensione 28 giorni dall'ultimo soggiorno 6 mesi dal rientro
	<b>AMERICA CENTRALE</b> (Guatemala, El Salvador, Panama, Nicaragua, Costa Rica, Caraibi)	6 mesi dal rientro
	<b>AMERICA LATINA</b> (Brasile, Colombia, Suriname, Paraguay, Venezuela, Guyan, Ecuador, Bolivia, Peru', Argentina, Uruguay, Cile)	6 mesi dal rientro
	<b>NORD AFRICA</b> (Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco)	Nessuna sospensione salvo situazioni epidemiologiche particolari e in assenza di sintomatologia
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capo Verde</li> </ul>	28 giorni dall'ultimo soggiorno
	<b>AFRICA SUB SAHARIANA</b>	6 mesi dal rientro
	<b>REPUBBLICA SUDAFRICANA</b>	Nessuna sospensione salvo situazioni epidemiologiche particolari e in assenza di sintomatologia
	<b>ASIA</b> (India, Nepal, Bangladesh, Cambogia, Vietnam, Laos, Filippine, Indonesia, Thailandia, Malaysia, Nuova Guinea)	6 mesi dal rientro
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maldive, Mauritius, La Reunion, Seychelles</li> </ul>	28 giorni dall'ultimo soggiorno
	<b>ISOLE PACIFICO</b>	28 giorni dall'ultimo soggiorno
	<b>AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA</b>	Nessuna sospensione salvo situazioni epidemiologiche particolari e in assenza di sintomatologia